

QL
1
DG72
NH

ISSN 0417 - 9927

DORIANA

Supplemento agli
ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA"
GENOVA

Vol. VII - N. 326

21. XI. 2001

RES LIGUSTICAE
CCXXXIV

LUCA BAGHINO (*)

AVVISTAMENTI ORNITOLOGICI INTERESSANTI PER LA LIGURIA

Segnalo con questa nota alcune osservazioni compiute in Liguria, utili per implementare lo *status* fenologico per l'ambito regionale delle specie qui trattate.

Bubulcus ibis (Linnaeus)


Airone guardabuoi

Ventidue individui sono stati osservati mentre pasturavano nei prati dell'Aeroporto "C. Panero" di Villanova d'Albenga (SV) il 28 novembre 1999.

La specie ha evidenziato un fenomeno di espansione molto marcato nel Mediterraneo occidentale e in Italia, dove i primi casi di nidificazione sono stati registrati alla metà degli anni '80 (Brichetti in MESCHINI & FRUGIS, 1993); particolarmente notevole è l'incremento delle presenze riscontrato nel corso dell'inverno 1998/99, con segnalazioni provenienti da molte regioni d'Italia, soprattutto nordorientali (GUSTIN *et al.*, 2001).

In Liguria, negli ultimi quindici anni, la specie era stata segnalata con relativa regolarità in periodo invernale ma finora sempre con effettivi modesti (TRUFFI in SPANÒ *et al.*, 1998).

(*) Via L. Allegro 37/1 I-16016 Cogoleto (GE).



Buteo rufinus (Cretzschmar)

Poiana codabianca

Un giovane è stato visto in migrazione sulle alture di Arenzano (GE) il 26 settembre 2001. La segnalazione, sottoposta al Comitato Italiano Rarità per una valutazione, è stata ulteriormente confermata.

MINGOZZI (1987) riepiloga le quattro segnalazioni liguri, tre delle quali si riferiscono alla stagione autunnale (ottobre 1932, novembre 1956 e novembre 1966) ed una a quella primaverile.

Il relativo aumento di osservazioni della specie, per quanto riguarda l'Italia meridionale e il versante adriatico, è interpretato come un'espansione verso ovest dell'areale dell'Europa sudorientale (CORSO, in stampa).

Hippolais icterina (Vieillot)

Canapino maggiore

Due individui hanno sostato dal 26 luglio al 18 agosto 1999 in un orto di Genova, nel quartiere di Marassi.

I due soggetti, adulti, nella loro prolungata permanenza si sono dedicati ad attività di ricerca del cibo in un frutteto arboreo attiguo ad un giardino; frequentavano in particolare la metà superiore di un grande albero di fico comune (*Ficus carica*), all'ombra del fogliame.

Già considerato da BRICHETTI (1976) come occasionalmente estivante nel Nord Italia e più di recente inserito da BRICHETTI & MESCHINI (MESCHINI & FRUGIS, 1993: pag. 287) tra le specie dubitativamente presenti come nidificanti in Italia, per la Liguria sono disponibili generiche indicazioni di nidificazione riferite dagli Autori storici (DURAZZO, 1840, GIGLIOLI, 1889); l'attuale status fenologico del Canapino maggiore risulta essere quello di migratore regolare, più abbondante in autunno (SPANÒ & TRUFFI, 1987).

L'avvistamento qui riportato è presumibilmente da riferire ad individui in migrazione postnuziale anticipata; in questo contesto è da segnalare, per la relativa corrispondenza temporale e l'ambito geografico, la cattura di un soggetto inanellato in Polonia nel maggio 1982 e ripreso alla Spezia il 4 luglio 1985 (BIAGIONI, 1994).

Sylvia sarda* Temminck*Magnanina sarda**

Un maschio è stato osservato sul promontorio di Portofino il 23 marzo 2001.

Della specie, considerata generalmente stazionaria e capace di spostamenti di breve e corto raggio (TORRE in MESCHINI & FRUGIS, 1993), vengono riferite dagli Autori storici generiche menzioni di presenza e nidificazione in Liguria non confermate dall'Atlante degli Uccelli nidificanti in Liguria (AA.VV., 1989).

Più di recente, SPANÒ & PODESTÀ (1981) segnalano un solo individuo catturato il 13 aprile 1978 ai Piani di Lavagna (GE) nell'arco di un quindicennio di inanellamenti effettuati tra il 1966 e il 1981; negli ultimi anni è stata notata anche a Genova (BORGO, SPANÒ & TRUFFI, 2001) e un individuo è stato catturato nell'aprile 1999 all'Isola Palmaria (SP), unico dato dell'anno raccolto in tutte le stazioni di inanellamento impegnate nel Progetto Piccole Isole (MASSINEO, SPINA & MANTOVANI, 2001).

Sturnus roseus* (Linnaeus)*Storno roseo**

Un adulto è stato osservato in località Case Voltino, sulle alture di Genova Voltri, il 28 maggio 2001, nel quadro di una delle periodiche invasioni tipiche della specie.

La data di osservazione è in linea con il periodo di picco riscontrato (maggio-giugno, cfr. BORGO, SPANÒ & TRUFFI, 1998) nelle catture menzionate in letteratura e note per la Liguria dai tempi storici ad oggi (oltre 60), le ultime delle quali risalgono al 1962 e al 1963 (MOLTONI, 1969).

La località di osservazione trova riscontro spaziale anche con buona parte di quelle documentate, comprese nell'area tra Genova e Savona (MOLTONI, l.c.).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1989 - Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria - Regione Liguria; Ed. Sagep, Genova, 208 pp.
- BIAGIONI M., 1994 - Guida al Parco Fluviale della Magra - Ed. Luna, La Spezia, 174 pp.
- BORGIO E., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1998 - Materiali per una storiografia ornitologica minore. Nota 4: la collezione Pinelli Gentile di Tagliolo Monferrato (AL) - *Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova*, 62-63 (1996-97): 5-29.
- BORGIO E., SPANÒ S. & TRUFFI G., 2001 - L'atlante ornitologico della città di Genova: stato della ricerca - *Avocetta*, Torino, 25 (1): 160.
- BRICHETTI P., 1976 - Atlante Ornitologico Italiano. Vol. II - Ed. F.lli Scalvi, Brescia, 555 pp.
- BRICHETTI P., 1993 - Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* in: MESCHINI E. & FRUGIS S. (Eds) - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Ozzano Emilia; 20: 55.
- DURAZZO C., 1840 - Degli uccelli liguri. - Tip. Ponthenier, Genova, 95 pp.
- GIGLIOLI E., 1889 - Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Avifauna italiana - Succ. Le Monnier, Firenze, VIII + 706 pp.
- GUSTIN M., ARCAMONE E., CORSO A., PASSARELLA M. & PIZZARI T., 2001 - Recent increase in wintering and breeding of Cattle Egret *Bubulcus ibis* population in Italy, *Alauda*, Paris 69 (2): 311-318.
- MASSINEO A., SPINA F. & MANTOVANI R., 2001 - Progetto Piccole Isole: risultati 1998-1999 - *Biol. Cons. Fauna*, Ozzano Emilia, 108: 1-148.
- MESCHINI E. & FRUGIS S. (Eds.), 1993 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Ozzano Emilia, 20: 1-344.
- MINGOZZI T., 1987 - Revisione critica delle segnalazioni italiane di Poiana codabianca (*Buteo rufinus* Cr.). In: Baccetti N. e Spagnesi M. (Eds.): Rapaci Mediterranei III - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Ozzano Emilia, 12: 155-167.
- MOLTONI E., 1969 - Lo Storno roseo *Pastor roseus* (L.) in Italia - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 39: 128-157.
- SPANÒ S. & PODESTÀ E., 1980-81 - Quindici anni di inanellamenti a Chiavari e Lavagna (Osservatorio Ornitologico Ligure): risultati e osservazioni - *Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova*, 48-49: 143-168.
- SPANÒ S. & TRUFFI G., 1987 - Gli uccelli della Liguria occidentale - Regione Liguria; Ed. Sagep, Genova, 151 pp.
- TORRE A., 1993 - Magnanina sarda *Sylvia sarda*. In: Meschini E. e Frugis S. (Eds) - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Ozzano Emilia, 20: 214.
- TRUFFI G., 1998 - Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* (Linnaeus 1758). In: Spanò S., Truffi G. & Burlando B. (red.). Atlante degli uccelli svernanti in Liguria - Catalogo dei beni naturali n. 3 - Regione Liguria; Ed. Sagep, Genova: 49.

RIASSUNTO

Sono citati recenti avvistamenti liguri di cinque specie di Uccelli: Airone guardabuoi, Poiana codabianca, Canapino maggiore, Magnanina sarda e Storno roseo.

ABSTRACT

The author recounts and analyses some Ligurian sightings of Cattle Egret *Bubulcus ibis*, Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*, Icterine Warbler *Hippolais icterina*, Sardinian Warbler *Sylvia sarda* and Rose-colored Starling *Sturnus roseus*, species of particular phenological interest for the Ligurian area.
